



## TILTAKSKORT FOR BARNEHAGE / SKOLE / SFO VED

### BRENNKOPPER

|  |   |
|--|---|
| Om brennkopper                           | Brennkopper er en hudinfeksjon forårsaket av bakterier, enten gule stafylokokker eller streptokokker. Tilstanden kan variere i utseende og utbredelse på huden.   |
| Smittemåte                               | Brennkopper smitter gjennom direkte kontakt med infiserte hudområder eller via infiserte gjenstander.   |
| Symptomer og tegn til smitte             | <p>Det finnes to sykdomsvarianter. Det vanligste er at det danner seg områder i huden med utslett som dekkes av en tykk honninggul skorpe. Det er vanlig med svie i påvirkede områder.</p> <p>I sjeldnere tilfeller kan det oppstå større blemmer på opp til 3 cm i diameter som inneholder væske med varierende utseende. Tilstanden kan affisere alle områder av huden.</p>   |
| <b>Tiltak ved utbrudd av brennkopper</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• God håndhygiene er det viktigste forebyggende tiltaket. Ved utbrudd i barnehager, skoler eller SFO må god og systematisk håndhygiene innskjerpes.</li><li>• Områder med utslett bør tildekkes da dette forebygger smitte.</li><li>• Barn med brennkopper kan vende tilbake til barnehagen når det ikke lenger er fare for at smitteførende sårsekret kan påføres andre barnehagebarn direkte eller indirekte.</li></ul> <p>Ved få og små områder med utslett vil dette kunne ivaretas gjennom god tildekking, men ved mer utbredte områder med utslett vil det være nødvendig at lesjonene er tørre og i ferd med å hele opp.</p> |
| <u>Informasjon fra:</u><br>Helsenorge.no | <a href="#">«Brennkopper»</a>   |
| Folkehelseinstituttet                    | <a href="#">«Smittevern i barnehage og skole»</a>   |