

**TILTAKSKORT FOR BARNEHAGE / SKOLE / SFO
VED****KIKHOSTE**

Om kikhoste	Kikhoste er en bakteriell luftveisinfeksjon forårsaket av Bordetella pertussis. Infeksjonen smitter svært lett.
Smittemåte	Dråper med bakterier frigis ved hosteanfall. Smitteførende periode varer bare ca. 3 uker fra symptomdebut eller inntil 5 dager etter påbegynt antibiotikabehandling.
Symptomer og tegn til smitte	Sykdomsforløpet deles inn i to stadier: Det katarralske stadiet med forkjølelsesliknende symptomer som hoste, feber og rennende nese som varer ca. 1 uke. Etterpå følger anfallstadiet som er kjennetegnet av kraftige hosterier med pusteproblemer (kiking), eventuelt med brekninger eller oppkast. Anfallene kan vare i flere uker. Kikhoste kan være farlig for små barn, spesielt for spedbarn, fordi de kan slutte å puste i forbindelse med hosteanfallene.
Tiltak ved utbrudd av kikhoste	<ul style="list-style-type: none">• Ved tilfeller av påvist kikhoste, og spesielt ved to eller flere tilfeller i samme barnehage, bør smittevernkontoret kontaktes så snart som mulig slik at adekvate tiltak kan iverksettes• Det kan bli aktuelt med fremskyndet vaksinasjon og forebyggende behandling.• Ved behandling tidlig i sykdomsforløpet blir man vanligvis smittefri 5 dager etter igangsatt behandling, og barn bør derfor holdes hjemme fra barnehage/skole/SFO i denne perioden.• Ved behandling senere i sykdomsforløpet vil smittsomheten være betydelig mindre, og barn kan derfor gå i barnehage/skole/SFO dagen etter igangsatt behandling.
<u>Informasjon fra:</u> Helsenorge.no	«Kikhoste»
Folkehelseinstituttet	«Smittevern i barnehage og skole»